



ఎలా తెలుసుకున్నాం? -17

తోరకచుక్కలు

ఐజాక్ అసిమోవ్

అనువాదం: డా॥ వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి



విజ్ఞాన ప్రచురణలు



మంచి పుస్తకం

ఎలా తెలుసుకున్నాం? - 17

తోకచుక్కలు

ఐజాక్ అసిమోవ్

అనువాదం : డా|| వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి



విజ్ఞాన ప్రచురణలు



మంచి పుస్తకం

How Did We Find Out About COMETS? by Isaac Asimov

ఎలా తెలుసుకున్నాం? - 17

తోకచుక్కలు

రచయిత : ఐజాక్ అసిమోవ్
అనువాదం : డా॥ వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి
మొదటి, రెండవ ముద్రణలు : జూన్ 2009, మార్చి 2015
మూడవ ముద్రణ : నవంబర్ 2017
ప్రతుల సంఖ్య : 2000

వెల : రూ. 25/-

ISBN No. 978-93-80153-00-1

ప్రచురణ, ప్రతులకు :

విజ్ఞాన ప్రచురణలు

ప్రజా పైన్స్ వేదిక

జి. మాల్వార్థి, ప్రచురణల విభాగం

162, విజయలక్ష్మీనగర్, నెల్లూరు - 524 004,

ఫోన్: 94405 03061

మంచి పుస్తకం

12-13-439, వీధి నెం. 1,

తార్నాక, సికింద్రాబాద్ - 500 017.

ఫోను: 94907 46614

email: info@manchipustakam.in

website: www.manchipustakam.in

ముద్రణ :

చరిత ఇంప్రెషన్స్,

1-9-1126/బి, అజామాబాద్,

హైదరాబాద్-20. ఫోన్: 040-2767 8411

విషయ సూచిక


1. తోకలున్న చుక్కలు	...	05
2. దూరాలు - కక్ష్యలు	...	11
3. తిరిగొచ్చిన తోకచుక్క	...	19
4. పలచని తోకచుక్కలు	...	25
5. మృతి చెందిన తోకచుక్క	...	30
6. ఇంతకీ తోకచుక్కలలో ఏముంటుంది?	...	37

1. తోకలున్న చుక్కలు

మనుషులు చీకటి ఆకాశపు అందాలని ఎన్నో వేల ఏళ్ళుగా గమనిస్తూ వస్తున్నారు.

రాత్రివేళ వినువీధిలో విసిరేసిన ముత్యాల్లా వేల తారలు మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి. చూసేవారికి ఆ తారలు కొన్ని ఆకృతులుగా ఏర్పడి ఉండడం కనిపిస్తుంది. ప్రతి రాత్రీ ఆ ఆకృతులే మనకి ఆకాశంలో దర్శనం ఇస్తాయి. ఇవి ఒక నల్లని గోళంలో పొదగబడి ఉన్నట్లు, ఆ గోళం సాఫీగా, క్రమబద్ధంగా పరిభ్రమిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

తారలతో పాటు చంద్రుడు కూడా కనిపిస్తాడు. అయితే తారలలా మెరిసే చుక్కల్లా కాకుండా విస్తరించిన వస్తువులా ఉంటాడు చంద్రుడు.




19వ శతాబ్దంలో నక్షత్రాలను చూసేందుకు దూరదర్శిని

కొన్నిసార్లు మెరిసే పూర్ణబింబంలా కనిపిస్తే, మరి కొన్ని సార్లు అర్థ వృత్తంలాగానో, నెలవంక లాగానో కనిపిస్తాడు. చంద్రుడు ప్రతి రాత్రీ తార నుండి తారకి కదలడం కనిపిస్తుంది. ఒక రోజు అర్ధరాత్రి ఒక తార వద్ద కనిపిస్తే, మరో రోజు అర్ధరాత్రి మరో తారవద్ద కనిపిస్తాడు.

తారలని మించిన ప్రకాశం గలిగి, కొంచెం

తారలాగానే కనిపించే మరో ఐదు వస్తువులు కూడా ఆకాశంలో కనిపిస్తాయి. వాటినే మనం బుధుడు, శుక్రుడు, అంగారకుడు, బృహస్పతి, శని అంటాం. అవి కూడా ప్రతి రాత్రి ఒక తార నుండి మరో తార వద్దకి జరగడం చూస్తాం.



సౌర కుటుంబం

ఈ ఐదు ప్రకాశవంతమైన వస్తువులనే ప్రాచీన గ్రీకులు గ్రహాలు (planets) అన్నారు. “సంచారం” అనే అర్థం గల గ్రీకు పదం నుండి ఈ పదం వచ్చింది. గ్రహాలు ఆకాశంలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి కదా? అయితే ఆ కాలంలో సూర్య, చంద్రులను కూడా గ్రహాలనే అనుకునే వారు. వాటిని కూడా కలుపుకుని మొత్తం ఏడు గ్రహాలు ఉన్నాయని భావించేవారు.

ప్రాచీనులు ప్రతి రాత్రి గ్రహాల కదలికలను గమనించి అవి కొన్ని కచ్చితమైన గతులలో

కదులుతున్నాయన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు. చంద్రుడు ఆకాశంలో వృత్తాకారపు గతిలో కదులుతాడు. ఒక తార వద్ద మొదలై ఇంచుమించు 27 రోజుల్లో తన వృత్తాకారపు ప్రయాణాన్ని పూర్తిచేసి తిరిగి మొదటి తారని చేరుకుంటాడు.

అంటే అంతరిక్షంలో కనిపించే వివిధ వస్తువుల కదలికలని కచ్చితంగా నిర్ణయించవచ్చు. చంద్రుడు ఒకే బాటలో పదే పదే సంచరిస్తూ ఉండడం ప్రాచీనులు (“ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు”) గమనించారు. భవిష్యత్తులో ఫలానా

రోజు చంద్రుడు ఏ తార వద్ద ఉంటాడో, ఏ ఆకారంలో కనిపిస్తాడో అన్నీ ముందే నిర్ణయించి చెప్పొచ్చు.

అయితే ఇతర గ్రహాల గతులు మరికాస్త సంక్లిష్టంగా ఉన్నట్టు కనిపించింది. కొన్నిసార్లు చంద్రుడు కదిలే దిశలోనే అవీ కదులుతుంటాయి. మరి కొన్నిసార్లు గిరుక్కున వ్యతిరేక దిశలో తిరిగి కొంత కాలం పయనిస్తాయి. వివిధ వేగాలతో పయనిస్తాయి. అన్నీ చంద్రుడి కన్నా మెల్లగా ప్రయాణిస్తాయి.

ఏదేమైనా గ్రహాలని కూడా తగినంత కాలం గమనిస్తే వాటి గతిలోనూ ఒక తీరు తెన్ను కనిపిస్తుంది. అలా కొంత కాలం గమనిస్తే ఏ గ్రహం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందో నిర్ణయించడానికి వీలవుతుంది.

అరుదుగా వచ్చే సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం వంటి సంఘటనలని కూడా నిర్ణయించడానికి వీలయ్యింది. సూర్యుడికి అడ్డుగా చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుందో ముందే చెప్పగలిగేవారు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు. చంద్రుడికి, సూర్యుడికి మధ్య భూమి నిలిచినప్పుడు, భూమి నీడ చంద్రుడి మీద పడినప్పుడు వచ్చేదే చంద్రగ్రహణం. 3000 ఏళ్ళకి పూర్వమే గ్రహణాలని నిర్ణయించగల పరిజ్ఞానం ఉండేదని దాఖలాలు ఉన్నాయి.


గతులు ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉన్నా గ్రహాలు కూడా ఆకాశంలో కొన్ని కచ్చితమైన మార్గాలలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ సంచరించడం వల్ల మన పని తేలిక అయ్యింది. విశ్వయంత్రాంగం అంతా క్రమబద్ధంగా, ఒక చక్కని మరలాగా తీరుగా పనిచేస్తున్నట్టు అనిపించింది. ఆకాశంలో అన్నీ తీరుగా ఉన్నప్పుడు మరి భూమి మీద వ్యవహారాలు కూడా అలాగే ఉంటాయన్న ఆశ కలిగింది.

అయితే అప్పుడప్పుడు ఈ క్రమాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఆకాశంలో అనుకోని సంఘటన ఏదైనా ఎదురయితేనో? మనం ఎదురుచూడని అసామాన్యమైన ఘటన ఏదైనా సంభవిస్తేనో? అప్పుడు విశ్వయంత్రాంగంలో ఎక్కడో అపశ్రుతి వచ్చినట్టేగా? మరి అలాంటప్పుడు భూమి మీద కూడా ఏవైనా అసాధారణ పరిణామాలు కలగొచ్చుగా?

ఆకాశంలో అప్పుడప్పుడు ఒక మెరిసే వస్తువు తాత్కాలికంగా కనిపించి మాయమయ్యేది. మామూలుగా అలాంటి దృశ్యం నిశిరాత్రిలో కనిపించదు. నక్షత్రాలలా అదో కాంతి బిందువు కాదు. సూర్యచంద్రుల్లా కాంతి బింబమూ కాదు.

ఈ విచిత్ర వస్తువు తారల కన్నా పెద్దదే అయినా దీనికి కచ్చితమైన అకృతి ఉన్నట్టు కనిపించదు. సన్నని మెరిసే మబ్బు తునకలా ఉంటుంది. దాని ఒక కొన మెరిసే కుచ్చతోకలా దూరంగా విస్తరిస్తుంది.

మెరిసే కాంతి కురులున్న అవిస్ఫుటమైన ఆకారం గల ఏదో విచిత్రమైన తార అనుకున్నారు దాని గురించి. ప్రాచీన గ్రీకులు దీనికి, “అస్టర్ కొమెటెస్” అని పేరు పెట్టారు. అంటే “కురుల తార” అని అర్థం. అందులో రెండవ భాగాన్ని మాత్రం తీసుకుని, దాన్ని మరి కాస్త కుదించి, ప్రస్తుతం దీన్నే మనం “తోకచుక్క” (comet) అని పిలుస్తున్నాం.



ఆ తోకచుక్క కేంద్రంలో కొన్ని సార్లు నక్షత్రంలా ప్రకాశవంతమైన కేంద్రం కనిపిస్తుంది. దీన్నే ‘కేంద్రకం’ అంటారు. కేంద్రకం చుట్టూ కాస్త పలచగా, మసకమసకగా ఉండే కాంతినే ‘కోమా’ అంటారు. దాని వెనుకనే ఏర్పడే మసక కాంతుల బాటనే “తోక” అంటారు.

ఈ తోకచుక్కలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాయో ప్రాచీన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పలేకపోయే వారు. తోకచుక్క ఆకాశంలో ఎటు పోతోందో ఎక్కడ మాయమవుతుందో తెలిసేది కాదు.

అప్పటికే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఆకాశంలో వివిధ వస్తువుల గతుల గురించి లెక్కలు వేశారు. గ్రహాలు మొదలైన వస్తువులు దీర్ఘవృత్త కక్ష్యలలో తిరుగుతాయని కనుక్కున్నారు. అయినా తోకచుక్కల గతుల విషయం ఎవరికీ అంతుబట్టడం లేదు. మనుషుల పూర్వానుభవం అంతా అంతరిక్షంలో వస్తువులన్నీ కొన్ని కచ్చితమైన గతులలో నియమబద్ధంగా కదులుతాయనే చెబుతోంది. కాని అలాంటి కట్టుబాట్లేవీ లెక్కచెయ్యకుండా ఉండుండి ఊడిపడే ఈ తోకచుక్కల గురించి అందరికీ భయం పట్టుకుంది. గోడగడియారంలా కచ్చితంగా సాగే విశ్వక్రమంలో తటాలున ఒక తోకచుక్క ఊడిపడ్డప్పుడు భూమి మీద ఎక్కడ ఏ అనర్థం జరగనుందో అని కంగారుపడడం మొదలుపెట్టారు. ఏ మహానుభావుడో దేహం చాలించవచ్చు. ఏ యుద్ధమో జరగవచ్చు. ఏ అంటువ్యాధి విస్తరించి లక్షలాది ప్రజలని పొట్టన పెట్టుకోవచ్చు.

తోకచుక్క కనిపించిన ప్రతిసారీ భూమి మీద ఏదో ఉపద్రవం జరుగుతున్నట్టు అనిపించేది (మరి ఎప్పుడూ నిజంగానే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటుంది కదా!). అలాంటి ఘటనకి తోకచుక్క ఒక హెచ్చరిక అనిపించింది. దాంతో తోకచుక్క కనిపిస్తే చాలు గుండె గుభేలు మనేది!

ఉదాహరణకి క్రీ.పూ. 44లో ఒక తోకచుక్క కనిపించింది. ఆ సంవత్సరమే రోమన్ నియంత జూలియస్ సీజర్ హత్య చెయ్యబడ్డాడు. క్రీ.శ. 1066లో కూడా ఒక తోకచుక్క కనిపించింది. ఆ ఏడాది నార్మండ్స్కి చెందిన విలియమ్ రాజు ఇంగ్లండ్ని ఆక్రమించాడు. ఆ ఘటన విలియమ్ దృష్టిలో మంచిదే కావచ్చు. కాని ఇంగ్లండ్కి మాత్రం గడ్డు రోజులు మొదలయ్యాయి.

ఆకాశంలో జరిగే వ్యవహారం అర్థం కాని మనుషులు ఇప్పటికీ తోకచుక్కలంటే భయపడతారు. తోకచుక్క కనిపిస్తే ముప్పు తప్పదు అని నమ్ముతారు. యుగాంతానికి అది సంకేతం అనుకుంటారు.



క్రీ.శ. 1066లో చిత్రించిన హేలీ తోకచుక్క

కాని ఇతర ఎన్నో ఖగోళ వస్తువుల లాగానే తోకచుక్కలు కూడా ఆకాశంలో కదిలే వస్తువులు మాత్రమే. భూమి మీద జరిగే సంఘటనల మీద వాటికి ఏ విధమైన ప్రభావమూ ఉండదు. కాని తోకచుక్కలు అసలేమిటో, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో, ఎక్కడికి పోతాయో, ఆకాశంలో ఎందుకు కనిపిస్తాయో, అర్థం కానంతకాలం తోకచుక్కలంటే మనుషులు బెదరడం సహజమే.

అదృష్టవశాత్తు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తోకచుక్కల గురించి క్రమంగా తెలుసుకుంటూ వచ్చారు. అందుకే చదువుకున్నవారు ఈ రోజుల్లో తోకచుక్కల గురించి భయపడరు.

2. దూరాలు - కక్ష్యలు

తోకచుక్కల గురించి లోతుగా ఆలోచించిన మొట్టమొదటి వాళ్ళలో ఒకడు గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్. ఇతగాడు 2000 ఏళ్ళ క్రితం జీవించాడు. ఆకాశంలో వస్తువులన్నీ కచ్చితమైన కక్ష్యలలో కదులుతుంటాయి కాబట్టి, తోకచుక్కల గతులకి తీరు తెన్ను లేదు కాబట్టి అసలవి అంతరిక్షానికి చెందిన వస్తువులే కావని అతడు రమారమి క్రీ.పూ. 350లో తీర్మానించేశాడు. నిప్పు అంటుకున్న గాలి తునకలే తోకచుక్కలు అన్నాడు. గాలిలో అక్కడక్కడ ఏవో వాయువులు నిప్పు అంటుకుని కాసేపు మండి ఆరిపోతుంటాయి. అవే తోకచుక్కలు అన్నాడు.

ప్రాచీన లోకానికి చెందిన అసమాన మేధావిగా అరిస్టాటిల్ పరిగణింపబడేవాడు. అతడు ఏం చెప్పినా అందులో తప్పుకుండా నిజం ఉంటుందని విశ్వసించేవారు. 1800 సంవత్సరాల పాటు ఆ భావాలే చలామణి అయ్యాయి. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలంతా తోకచుక్కలు ఖగోళ వస్తువులు కావని గాల్లో మండే విస్ఫులింగాలని నమ్మారు.


అలా ఎంతో కాలం ఈ విషయం గురించి సరయిన వివరణే లేకుండా ఉండిపోయింది. ప్రాచీన గ్రీకుల కాలం తరువాత తోకచుక్కల భయం ఎంతగా పెరిగిపోయిందంటే అసలు వాటికేసి సూటిగా చూడడానికే భయపడేవారు. ఎంతో కాలం తరువాత క్రీ.శ. 1473లో గ్రీకు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త రెజియో మాంటానస్ ఒక తోకచుక్కని గుర్తించి ప్రతి రోజూ దాని స్థానాన్ని గమనిస్తూ వచ్చాడు. అధునిక తోకచుక్కల అధ్యయనాలకి అతడి కృషి ఒక చిన్న తొలిమెట్టు అయ్యింది.

1532లో ఒక తోకచుక్క కనిపించినప్పుడు ఇద్దరు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని పరిశీలించారు. వారికో విచిత్రం కనిపించింది. వారిలో ఒకరు గిరోలామో ప్రాకాస్టోరో (1478- 1553) అనే ఇటాలియన్ దేశస్థుడు.

రెండవ వ్యక్తి పీటర్ ఏపియన్ (1495- 1552) అనే ఆస్ట్రియా దేశస్థుడు. తోకచుక్క తోక ఎప్పుడూ సూర్యుడుకి వ్యతిరేక దిశలో ఉండడం గమనించారు వీళ్ళు. తోకచుక్క సూర్యుడిని దాటి ఒక వైపు నుండి రెండవ వైపుకి పోయినప్పుడు తోక దిశ కూడా మారిపోయేది.

తోక చుక్కల విషయంలో ఇది మొట్టమొదటి శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణ. అన్ని తోకచుక్కల విషయంలోను అదే నిజం అని తేలింది. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించిన తోకచుక్కల తోకలన్నీ సూర్యుడికి వ్యతిరేక దిశలోనే ఉన్నాయి. అంటే తోకచుక్కలకి సూర్యుడికి మధ్య ఏదో సంబంధం ఉండి తీరాలి.

1577లో ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన ఆవిష్కరణ ఒకటి జరిగింది. ఆ సంవత్సరం ఆకాశంలో ఒక తోకచుక్క ప్రత్యక్షం అయ్యింది. టైకో బ్రాహే (1546- 1601) అనే డేనిష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త దాన్ని అధ్యయనం చేశాడు.



ఇతడిని మామూలుగా టైకో అని పిలుస్తుంటారు. అతడు ఆకాశంలో తోకచుక్క స్థానాన్ని గుర్తించడమే కాదు, అది ఎంత దూరంలో ఉందో కూడా అంచనా వేస్తానని బయలుదేరాడు.

ఆకాశంలో వస్తువుల దూరాన్ని అంచనా వేయడానికి దృష్టి విక్షేపం (parallax) అనే ఒక పద్ధతి ఉంది. ఈ పద్ధతిలో ఒకే వస్తువుని రెండు విభిన్న స్థానాల నుండి చూడాలి.

అలా చూసినప్పుడు వస్తువు స్థానం ఎలా మారుతుంది అన్న దాని బట్టి దాని దూరాన్ని అంచనా వేస్తారు.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోడానికి సరదాగా ఒక చిన్న ప్రయోగం చెయ్యొచ్చు. మీ చూపుడు వేలిని ముఖం ముందు పెట్టుకుని ఎడమ కన్ను మూసుకుని కుడి కంటితో చూడండి. వేలు ఒక ప్రత్యేక దిశలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వేలిని కదపకుండా కుడి కంటిని మూసుకుని ఎడమ కంటితో చూడండి. స్థిరంగా ఉన్న నేపథ్యంతో పోల్చి చూస్తే ఇప్పుడు వేలు పక్కకి జరిగినట్టు కనిపిస్తుంది.

ఎంత దూరం జరిగినట్టు అనిపించిందన్నది కంటికి వేలు ఎంత దూరంగా ఉంది అన్న దానిబట్టి ఉంటుంది. (ఇది కావాలంటే మీరే ప్రయోగం చేసి చూసుకోవచ్చు). కంటికి వేలు ఎంత దూరంగా ఉంటే అది అంత తక్కువగా పక్కకి జరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. దూరంగా ఉన్న వస్తువుల విషయంలో పెద్దగా స్థల మార్పిడి కనిపించదు.

దూరంగా ఉన్న వస్తువు విషయంలో దృష్టి విక్షేపం జరగాలంటే ఆ వస్తువుని ముందు ఒక స్థానం నుండి, తరువాత కాస్త దూరంలో ఉన్న (ఒక కిలోమీటర్ అనుకుందాం) మరో స్థానం నుండి చూడాలి.

ఇప్పుడు చంద్రుడు ఉన్నంత దూరంలో ఉన్న వస్తువులని చూడాలంటే కిలోమీటర్ దూరం కూడా సరిపోదు. పోనీ కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం అయితే సరిపోతుందా? అంత దూరం జరిగి చూస్తే నక్షత్రాల నేపథ్యంలో చంద్రుడు కొద్దిగా జరిగినట్టు కనిపించవచ్చు. రెండు పరిశీలనా స్థానాల మధ్య దూరాన్ని బట్టి, దృష్టి విక్షేపం యొక్క విస్తృతిని బట్టి చంద్రుడి దూరాన్ని అంచనా వేయొచ్చు.

దూరాన్ని కొలిచే ఈ చిట్కా ప్రాచీన గ్రీకు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకి కూడా తెలుసు. క్రీ.పూ. 130 నాటికే హిప్పార్కస్ (క్రీ.పూ. 190- 120) అనే గ్రీకు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త భూమికి, చంద్రుడికి మధ్య దూరం 3,86,000 కిలోమీటర్లు అని అంచనా వేశాడు.

హిప్పార్కుస్ చంద్రుడి విక్షేపాన్ని కొలిచినట్లుగానే 1577లో టైకో ఒక తోకచుక్కకి సంబంధించిన దృష్టి విక్షేపాన్ని అంచనా వెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. తోకచుక్క గాల్లో భాగం అయితే చంద్రుడి కన్నా చాలా దగ్గరిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని దృష్టి విక్షేపం చంద్రుడి దృష్టి విక్షేపం కన్నా చాలా ఎక్కువై ఉండాలి.

టైకో జర్మనీలో కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తని నియమించి రాత్రివేళ ఒక నిర్ణీత సమయంలో స్థిర తారావళి నేపథ్యంలో తోకచుక్క స్థానాన్ని కొలవమన్నాడు. అలాగే కచ్చితంగా అదే సమయంలో బోహేమియా నుండి మరో ఖగోళ శాస్త్రవేత్త తోకచుక్క స్థానాన్ని కొలిచాడు. టైకో కూడా స్వయంగా డెన్మార్క్‌లో తన పరిశీలనా కేంద్రం నుండి తోకచుక్క స్థానాన్ని కొలిచాడు.

ఫలితాలని పోల్చి చూడగా మూడు సందర్భాలలోను తోకచుక్క స్థానం ఇంచుమించు ఒకే విధంగా ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. చంద్రుడి విషయంలో కన్నా కూడా దృష్టి విక్షేపం మరింత తక్కువగా ఉండడం కనిపించింది.

అంటే తోకచుక్క చంద్రుడి కన్నా కూడా దూరంగా ఉందని అర్థం అన్నమాట. భూమికి చంద్రుడు ఉన్న దూరానికి ఇంచుమించు నాలుగింతలు దూరంలో ఉందని భావించాడు టైకో. అంటే 15 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం అన్నమాట.

అయితే ఈ అంచనా సరి కాదు. నిజానికి తోకచుక్క అంతకన్నా ఎంతో దూరంలో ఉంటుంది. అయినా టైకో కనుక్కున్న విషయం చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని బట్టి తోకచుక్క అంటే గాల్లో మండే విస్ఫులింగం కాదని అర్థమయ్యింది. అరిస్టాటిల్ సిద్ధాంతం తప్పని తేలింది. గ్రహాల మాదిరిగానే తోకచుక్క కూడా ఒక అంతరిక్ష సంచారేనని తెలిసింది.

మరి తోకచుక్కలు కూడా అంతరిక్ష వస్తువులే అయితే తక్కిన అంతరిక్ష

వస్తువులకి వీటికి మధ్య అంత తేడా ఎందుకుంది? ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం టైకోకి అంతుబట్టలేదు. అయితే ఆ కాలంలోనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షాన్ని కొత్త కొత్త కోణాల నుండి చూడడం నేర్చుకుంటున్నారు.

అప్పటి వరకు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు గ్రహాలన్నీ భూమి చుట్టూ చక్రగతులలో తిరుగుతాయని అనుకునేవారు. కాని 1543లో కోపర్నికస్ (1473- 1543) అనే పోలిష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఈ సమాచారాన్ని మరో విధంగా ప్రదర్శిస్తే బావుంటుందని సూచించాడు.

చంద్రుడు మాత్రమే భూమి చుట్టూ చక్రగతిలో తిరుగుతుందని సూచించాడు కోపర్నికస్. భూమి కూడా సూర్యుడి చుట్టూ చక్రగతిలో తిరుగుతోందన్నాడు. తక్కిన గ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యుడి చుట్టూనే చక్రగతుల్లో తిరుగుతున్నాయన్నాడు. ఈ విషయాలని సమ్మతిస్తే గ్రహాల కదలికలని అర్థం చేసుకోవడం చాలా తేలిక అవుతుంది. (ఒక వస్తువు చుట్టూ మరో వస్తువు తిరిగే మార్గాన్నే కక్ష్య (orbit) అంటారు. అది వృత్తం అన్న అర్థం గల లాటిన్ పదం నుండి వచ్చింది.)

సూర్యుడు, సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే వస్తు సముదాయాన్ని కలిపి సౌరమండలం అంటారు.

టైకోకి అనుచరుడిగా పనిచేసిన జర్మన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త జోహానెస్ కెప్లర్‌కి (1571- 1630) ఈ సిద్ధాంతంలో ఒక అంశం రుచించలేదు. గ్రహగతులని నిశితంగా పరిశీలించిన కెప్లర్ 1609లో సూర్యుడి కక్ష్యలు వృత్తాలు కావన్నాడు. గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తీయ కక్ష్యలలో తిరుగుతున్నాయన్నాడు.

దీర్ఘ వృత్తం సాగదీసిన వృత్తంలా ఉంటుంది. కొంచెంగానే సాగదీసిన వృత్తం చూడడానికి వృత్తం లాగానే ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకా సాగదీస్తున్న కొద్దీ వృత్తానికి, దీర్ఘవృత్తానికి మధ్య తేడా స్పష్టం అవుతుంది. కాకినాడ కాజాలా తయారవుతుంది.

సూర్యుడి చుట్టూ భూమి కక్ష్య ఇంచుమించు చక్రికంగానే ఉంటుంది. భూమి చుట్టూ చంద్రుడి చలనం కొంచెం సాగదీసినట్టు ఉంటుంది. సూర్యుడి చుట్టూ బుధుడి కక్ష్య ఇంకా సాగదీసినట్టు ఉంటుంది. కెప్లర్ కాలంలో తెలిసిన గ్రహకక్ష్యలలో అన్నిటికన్నా సాగదీసినట్టుండే బుధ గ్రహ కక్ష్యకి, వృత్తానికి కూడా నిజానికి అంత గొప్ప తేడా ఏమీ లేదు.

గ్రహాల దీర్ఘవృత్తీయ కక్ష్యలకి సూర్యుడు నిజానికి కేంద్రంలో లేడు. భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక కొసలో సూర్యుడికి 14,72,50,000 కిలోమీటర్ల దూరంలోను, మరో కొసలో 15,20,78,850 కిలోమీటర్ల దూరంలోను ఉంటుంది. రెండు దూరాలకి మధ్య తేడా 4 శాతం కూడా ఉండదు.

సూర్యుడు చుట్టూ బుధ గ్రహ కక్ష్య మరింత దీర్ఘ వృత్తీయంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దూరాల మధ్య తేడా మరి కాస్త ఎక్కువ. కక్ష్యలో సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా ఉండే బిందువు 4,50,00,000 కిలోమీటర్ల దూరంలోను, అతి దూరంగా ఉండే బిందువు 7,08,00,000 కిలోమీటర్ల దూరంలోను ఉంటుంది. అంటే తక్కువ దూరం కన్నా ఎక్కువ దూరం ఇంచుమించు 50 శాతం పెద్దది.


గ్రహాల దీర్ఘవృత్తీయ కక్ష్యలన్నీ కెప్లర్ అంచనా వేశాడు. మరి తోకచుక్కల మాటేమిటి? అవి కూడా అంతరిక్ష వస్తువులే అయితే మరి వాటికీ కక్ష్యలు ఉండాలిగా?

తోకచుక్కల కదలికలని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసిన కెప్లర్, అవి సరళ రేఖల్లో కదులుతున్నాయని ఊహించాడు. అవి అంతరిక్షంలో ఎంతో దూరం నుండి వచ్చి సూర్యుడిని దాటి అంతరిక్షంలో ఎంతో దూరానికి తరలిపోతాయని అనుకున్నాడు.

సూర్యుడికి బాగా దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, సూర్యకాంతి మీద పడి మెరవడం వల్ల, మనకి తోకచుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. సూర్యుడికి దగ్గర్లో

లేనప్పుడు కనిపించవు. అలాగే సూర్యుడిని దాటి దూరంగా పోయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ కనిపించకుండా పోతాయి. కాబట్టి ఈ తోకచుక్కలు సౌరమండలంలో భాగాలే కావని అనుకున్నాడు కెప్లర్. తోకచుక్క ఒకసారి సౌరమండలంలోకి ప్రవేశించి దాటి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇక మళ్ళీ సౌరమండలంలోకి రాదన్నమాట.

ఇలా ఉండగా ఇటలీకి చెందిన గియోవాన్నీ ఆప్టిన్స్ బోరేలీ (1608-1679) అనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త 1664లో ఆకాశంలో కనిపించిన తోకచుక్క కదలికలని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కెప్లర్ తో విభేదించక తప్పదని అనుకున్నాడు. ఆకాశంలో తోకచుక్క గమనాన్ని గమనించిన బోరేలీకి సూర్యుడి దగ్గర దాని గమనదిశ మారుతున్నట్టు కనిపించింది. సరళరేఖలో సూర్యుడిని సమీపిస్తూ, సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగి, ఒక కొత్త దిశలో మళ్ళీ సరళరేఖలో దూరంగా తరలిపోతుంది.



ఈ విచిత్రానికి బొరేలీ ఈ విధంగా వివరణ ఇచ్చాడు. తోకచుక్కల కక్ష్యలు బాగా సాగదీసిన కక్ష్యలు అన్నాడు. దానికి పోలిక కోసం ఒక సన్నని పొగచుట్టని ఊహించుకోవచ్చు. అలా ఒక వృత్తానికి ఒక కొన వద్ద నించుని మరో కొనని అపరిమితంగా సాగదీస్తూ పోతే అవతలి కొనకి అంతే లేకుండా పోతుంది. అలా ఒక పక్క అనంతంగా విస్తరించే దీర్ఘవృత్తాన్నే పారాబోలా అంటారు.

తోకచుక్క కక్ష్య పారాబోలా అయ్యుంటుందని ఊహించాడు బొరేలీ. ఆ కక్ష్యకి మూసి ఉన్న కొన సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అవతలి కొన తెరుచుకుని ఉంటుంది. కాబట్టి పారాబోలాకి ఒక శాఖ మీదుగా తోకచుక్క సూర్యుడిని సమీపించి, అవతలి శాఖ మీదుగా సూర్యుడి నుండి దూరంగా అంతరిక్షంలోకి చొచ్చుకుపోతుంది.

బొరేలీ భావాలు కూడా కెప్లర్ భావాలకి సన్నిహితంగానే ఉన్నాయి. అయితే కెప్లర్ తోకచుక్క కక్ష్య సరళరేఖలో ఉంటుందని అన్నాడు. బొరేలీ పారాబోలా అనుకున్నాడు. కెప్లర్ లాగానే బొరేలీ కూడా తోకచుక్క మొదట్లో సూర్యుడికి చాలా దూరంలో ఉండడం వల్ల కనిపించదని అనుకున్నాడు. సూర్యుడికి సన్నిహితం అవుతున్న కొద్దీ సూర్యకాంతి పడి మెరుస్తుందని, మళ్ళీ దూరం పెరుగుతున్న కొద్దీ క్రమంగా కాంతివిహీనం అవుతుందని అనుకున్నాడు. బొరేలీ కూడా కెప్లర్ లాగానే తోకచుక్కలు సౌరమండలానికి చెందినవి కావనే అనుకున్నాడు. తోకచుక్క ఒకసారి సౌరమండలాన్ని విడిచిపెట్టిందంటే సౌరమండలం ముఖం మళ్ళీ జన్మలో చూడదని అనుకున్నాడు!

3. తిరిగొచ్చిన తోకచుక్క

గ్రహాలు దీర్ఘవృత్తాలతో తిరుగుతాయన్న కెప్లర్ భావన గ్రహాల విషయంలో బాగానే సరిపోయింది కాని కొన్ని ప్రశ్నలు సమాధానాలు లేకుండా మిగిలిపోయాయి. అసలు గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకారపు కక్ష్యలలో ఎందుకు తిరుగుతాయి? మరేదైనా మార్గంలో తిరగొచ్చుగా? పైగా గ్రహాలు సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వేగంగాను, దూరంగా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగాను ఎందుకు కదులుతాయి?

ఈ సమస్యలనే కాక మరెన్నో ఇతర సమస్యల్ని కూడా బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త ఐసాక్ న్యూటన్ (1643-1727) పరిష్కరించాడు. 1687లో అతడు ప్రచురించిన ఒక పుస్తకంలో తన “గురుత్వ సిద్ధాంతం”ని వర్ణించాడు న్యూటన్. ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వంలో ప్రతి వస్తువు మరో వస్తువుని ఆకర్షిస్తుంది. వస్తువుల మధ్య ఆకర్షణ బలం వాటి ద్రవ్యరాశి మీద, వాటి మధ్య దూరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ బలాన్ని ఒక చిన్న సమీకరణంతో లెక్కించొచ్చు.

ఆ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి భూమి చుట్టూ చంద్రుడి కక్ష్యని, సూర్యుడి చుట్టూ భూమి మొదలైన గ్రహాల కక్ష్యలని లెక్కించొచ్చు.

ప్రతి గ్రహం కొన్నిసార్లు వేగంగాను, మరి కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగాను ఎందుకు కదులుతుందో కూడా ఈ సమీకరణంతో వివరించడానికి వీలయ్యింది. గ్రహాల మధ్య పరస్పర ఆకర్షణల వల్ల వాటి కక్ష్యలలో వచ్చే చిన్న చిన్న మార్పులని కూడా అదే సమీకరణంలో లెక్కించిడానికి వీలయ్యింది. భూమి మీద కెరటాల తీరుతెన్నులను కూడా ఈ సమీకరణం స్పష్టం చెయ్యగలిగింది.

ఇన్ని తెలిసినా తోకచుక్కల విషయం మాత్రం ఇంకా ఒక రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. తోకచుక్కలు పారాబోలా ఆకారం గల కక్ష్యలలో

తిరుగుతున్నా కూడా న్యూటన్ సమీకరణం సహాయంతో దాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి వీలవుతుంది. కాని తోకచుక్కల కక్ష్యలు నిజంగా పారాబోలాలు కాకపోతేనే? అవి కేవలం బాగా పొడవైన దీర్ఘవృత్తాలైతేనే?

తోకచుక్కని మనం దాని కక్ష్యలో ఒక అంచు వద్ద ఉన్నప్పుడే, అంటే సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడే గుర్తించగలం. దీర్ఘవృత్తం బాగా పొడవైనదై ఉంటే దాని కొన కాస్త మొనదేలి ఉంటుంది. దీర్ఘవృత్తం పొడవైనది మాత్రమే కాక అవతలి పక్క తెరుచుకుని ఉంటే, దీర్ఘవృత్తం కాస్తా పారాబోలాగా మారిపోతుంది.

కాని తోకచుక్క కక్ష్యలో మనకి కనిపించే భాగం ఎంత చిన్నది అంటే ఆ కక్ష్య మూసి ఉందో, తెరుచుకుని ఉందో చెప్పడం కష్టం అయ్యేది. తోకచుక్క కక్ష్య కేవలం అత్యంత పొడవైన దీర్ఘవృత్తమా, లేక ఒక పక్క తెరుచుకుని ఉన్న పారాబోలానా తేల్చుకోవడం గగనం అయిపోయింది.

కాని ఈ రెండు కక్ష్యలకి మధ్య ఒక ముఖ్యమైన తేడా ఉంది. కక్ష్య పారాబోలా అయితే అది ఒకసారి సౌరమండలాన్ని వదిలిపెడితే మళ్ళీ ఎప్పుడూ తిరిగి రాదు. అలా కాక కక్ష్య కేవలం సుదీర్ఘమైన దీర్ఘవృత్తమే అయితే, ఎప్పటికీ అప్పటికి తోకచుక్క సౌరమండలానికి తిరిగొస్తుంది.

ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తోకచుక్క కక్ష్య పొడవు కచ్చితంగా కొలవగలిగితే అది తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా కొలవగలరు. అదే జరిగితే అది న్యూటన్ సిద్ధాంతానికి ఒక గొప్ప విజయమే అవుతుంది. న్యూటన్ కి ఎడ్మండ్ హేలీ (1656-1742) అనే ఒక కుర్ర నేస్తం ఉండేవాడు. ఇతగాడే న్యూటన్ కి పుస్తక ప్రచురణలో సహాయపడ్డాడు. ఈ హేలీకి తోకచుక్క సమస్య మీదకి మనసుపోయింది.

ఇలా ఉండగా 1682లో ఒక తోకచుక్క కనిపించింది. ఆకాశంలో దాని సంచారాన్ని హేలీ క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశాడు. అతడికి కనిపించిన కాస్తంత కక్ష్యని బట్టి అది తిరిగి వస్తుందో లేదో చెప్పడం కష్టం అయ్యింది.

తిరిగి వచ్చే ప్రసక్తే ఉంటే ఇన్నేళ్ళకి ఒకసారి చొప్పున ఆ తోకచుక్క మళ్ళీ మళ్ళీ సూర్యుడి దగ్గరికి వస్తూ ఉండాలని, ప్రతిసారీ ఒకే కక్ష్యలో వస్తూ ఉండాలని ఊహించాడు హేలీ. గతంలో కనిపించిన తోకచుక్కల వృత్తాంతాలని సేకరించడం మొదలుపెట్టాడు. 1705 కల్లా రెండు డజన్ల తోకచుక్కల గురించిన వృత్తాంతాలని సంపాదించాడు. వాటిని తులనాత్మకంగా పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాడు.

తాను కళ్ళారా చూసిన 1682 నాటి తోకచుక్క నడిచిన మార్గం, వెనకటికి 1607లో కనిపించిన తోకచుక్క నడిచిన బాట ఇంచుమించు ఒకేలా ఉండడం కనిపించింది. అంతకుముందు 1532లో కనిపించిన ఒక తోకచుక్క (ప్రాకాస్టోరో, ఏపియన్లు సందర్శించిన తోకచుక్క ఇదే), అలాగే 1456లో కనిపించిన మరో తోకచుక్క కూడా అదే మార్గంలో కదలడం విశేషం.


75-76 ఏళ్ళ అవృత్తితో ఈ తోకచుక్కలు వస్తున్నాయన్నమాట. ఇది 75 ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తున్న ఒకే తోకచుక్క కావచ్చునేమో? ఇది చక్రికంగా వచ్చే తోకచుక్క కావచ్చునేమో?

75 ఏళ్ళకి ఒకసారి వచ్చే తోకచుక్క కక్ష్య ఎలా ఉండాలో లెక్కించాడు హేలీ. 1682లో కనిపించిన తోకచుక్క బాటతో ఆ కక్ష్య సరిగ్గా సరిపోయింది.

ఫలితాలు నమ్మశక్యం కాలేదు. సూర్యుడికి అత్యంత దూరంలో ఉన్న శనిగ్రహం (హేలీ నాటికి తెలిసిన గ్రహాలలో అదే అత్యంత దూరంలో ఉన్న గ్రహం) కూడా ఎప్పుడూ సూర్యుడి నుండి 15,00,00,00,000 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని మించి పోదు. కాని 1682 నాటి తోకచుక్క సూర్యుడి నుండి 5,15,00,00,00,000 కిలోమీటర్ల దూరం పోతోంది. దాని సుదీర్ఘమైన దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్య అవతలి కొన సూర్యుడికి అంత దూరంలో ఉందన్నమాట. సూర్యుడికి శనికి మధ్య గరిష్ట దూరానికి ఈ తోకచుక్క దూరం ఇంచుమించు 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది.

అదలా ఉండగా హేలీ కనుక్కున్న తోకచుక్క ప్లూటో, నెప్ట్యూన్, యురేనస్, బృహస్పతి మొదలైన గ్రహాలని దాటుకుంటూ సూర్యుడికి అత్యంత సన్నిహితంగా వచ్చినప్పుడు సూర్యుడికి 8,70,00,000 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వచ్చింది. అంటే భూమికి సూర్యుడికి మధ్య దూరంలో ఇంచుమించు సగం అన్నమాట.

1682 నాటి తోకచుక్క కక్ష్యని లెక్కించిన హేలీ ఆ తోకచుక్క మళ్ళీ



1758లో తిరిగి వస్తుందని అంచనా వేశాడు. అది ఏ మార్గం వెంట వస్తుందో కూడా చెప్పాడు.

తిరిగొచ్చిన తోకచుక్కని చూడడానికి హేలీ మరి లేడు. 1742లో 86 ఏళ్ళ వయసులో మరణించాడు. తోకచుక్క తిరిగిరావడానికి తను చెప్పిన గడువు ఇంకా చాలా దూరంలో ఉంది.

అయితే తోకచుక్క కోసం కాచుకు కూర్చున్న వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు. హేలీ చెప్పిన తోకచుక్క మార్గాన్ని ఫ్రెంచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అలెక్సిస్ క్లార్డ్ క్లేరాట్ (1713-1765) అధ్యయనం చేశాడు. బృహస్పతి, శని వంటి బృహద్ గ్రహాల గురుత్వాకర్షణ వల్ల తోకచుక్క రాక కాస్త ఆలస్యం అవుతుంది అనిపించింది అతనికి. అది తిరిగి సూర్యుడి దరిదాపులకి వచ్చేసరికి 1759 వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాడు.

1758లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఆకాశంలో హేలీ చెప్పిన ప్రాంతంలో తోకచుక్క కనిపిస్తుందని ఎదురుచూస్తున్నారు. టైకో మొదలైన వెనకటి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల్లా వీళ్ళు తమ కళ్ళమీదే ఆధారపడనక్కర్లేదు. 1609లో దూరదర్శిని కనుగొన్నారు.

1758లో డిసెంబర్ 25న, అంటే క్రిస్మస్ నాడు, యోహాన్ జార్డ్ పాలిట్జ్ (1723-1788) అనే ఒక జర్మన్ రైతు ఈ తోకచుక్కని కనుక్కున్నాడు. ఖగోళ దర్శనం ఇతడికి ఒక సరదా. 1682లో హేలీ చెప్పినట్లుగా ఆకాశంలో అదే ప్రాంతంలో ప్రత్యక్షమై, అదే కక్ష్యలో కదులుతూ కనిపించింది. ఇంచుమించు క్లేరాట్ నిర్ణయించిన సమయానికే సూర్యుడికి అత్యంత సన్నిహితంగా వచ్చిందా తోకచుక్క.

1682 నాటి తోకచుక్క మళ్ళీ తిరిగొచ్చింది అనడానికి సందేహం లేదు. దాంతో తోకచుక్కలకి సంబంధించిన చిక్కుముడి విడిపోయింది. సౌరమండలంలో ఇతర వస్తువులని శాసించే నియమాల్లే దీని మీదా పనిచేస్తున్నాయి. అయితే తోకచుక్కల కక్ష్య మరింత దీర్ఘవృత్తీయంగా ఉన్నదంతే.

ఆ విధంగా 1682లో కనిపించి మళ్ళీ 1758లో తిరిగొచ్చిన తోకచుక్కకి 'హేలీ తోకచుక్క' అని పేరు పెట్టారు.

తోకచుక్కలన్నిటోకి పేరుమోసిన తోకచుక్క ఇదే. క్రీ.శ 1066లో నార్మండ్ రాజు విలియమ్ ఇంగ్లండ్ మీదకి దండయాత్రకి సిద్ధం అవుతున్నప్పుడు కనిపించిన తోకచుక్క ఇదే. క్రీ.పూ. 11లో, జీసస్ పుట్టినప్పుడు కనిపించిన తోకచుక్క కూడా ఇదే. ఇదే బతెల్ హామ్ తార అని కూడా కొందరు నమ్ముతారు.

పాలిట్జ్ చూసిన తరువాత హేలీ తోకచుక్క ఇంకా రెండు సార్లు తిరిగొచ్చింది. 1835లో మార్క్ ట్వెయిన్ (అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ హాకెల్ బెరీ ఫిన్ మొదలైన పుస్తకాల రచయిత) పుట్టినప్పుడు కూడా అది ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తూ కనిపించింది. అది మళ్ళీ తిరిగొచ్చింది.

4. పలచని తోకచుక్కలు

75 ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తుంది కాబట్టి దాని కక్ష్య మరీ అంత పొడవైనది కాదన్నమాట. ఇంకా పొడవైన కక్ష్యలు ఉన్న తోకచుక్కలు వందల, వేల ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తుంటాయేమో.

1800లలో కొన్ని తోకచుక్కలు కనిపించాయి. 1812, 1861, 1882లో కనిపించాయి. ఇవి ఇంకా పెద్దగా, ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి. వాటి కక్ష్యలు మరింత పొడవుగా ఉన్నాయి. వాటి రాకకి వేల ఏళ్ళు పడుతుందేమో. గతంలో అవి సూర్యుడి సమీపానికి వచ్చినప్పుడు మనిషి గుహలలో బతుకుతూ, తోకచుక్కలని పెద్దగా పట్టించుకోని, ఆదిమానవుడు అయ్యుంటాడు. అవి మళ్ళీ తిరిగొచ్చే సమయానికి మన ప్రపంచం, మానవజాతి ఏ స్థితిలో ఉంటుందో!

అలాంటి తోకచుక్కల పూర్తి కక్ష్యలని మనకి కనిపించే కాస్త పాటి కక్ష్యల బట్టి లెక్కించడానికి వీలుపడదు. అవి అంతకు ముందెన్నడూ రాలేదు కాబట్టి వాటి కక్ష్యలని ఇతర తోకచుక్కల కక్ష్యలతో హేలీ పోల్చి చూసినట్లుగా పోల్చడానికి కూడా కుదరదు.

మనకి తెలిసిన ప్రకాశవంతమైన తోకచుక్కలు అన్నిటాకీ హేలీ తోకచుక్క కక్ష్య చాలా చిన్నది. కచ్చితంగా అది ఎప్పుడు తిరిగొస్తుందో నిర్ణయించడానికి కూడా ఈ ఒక్క తోకచుక్క విషయంలోనే సాధ్యం అయ్యింది.

ఆ విధంగా తోకచుక్కలు కూడా సౌరమండలంలో సభ్యులేనని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు. వాటి కక్ష్యలు కూడా దీర్ఘవృత్తాలు అని కనుక్కున్నారు. తగినన్నిసార్లు కనిపించే తోకచుక్కల కక్ష్యల పరిమాణాలని కూడా అంచనా వేయగలుగుతున్నారు.

1682 నాటి తోకచుక్క మళ్ళీ 1758లో తిరిగొస్తుందని హేలీ జోస్యం చెప్పడం చూసి చాలా మంది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తోకచుక్కల మీదకి దృష్టి సారించారు. కళ్ళతో ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నప్పుడు కేవలం ప్రకాశవంతమైన తోకచుక్కలు ఎన్నో చూడొచ్చు.

అలా ఎన్నో పలుచని తోకచుక్కలు కనుక్కున్నారు. ప్రతి ఏడు కొన్ని తోకచుక్కలు కనుక్కుంటూ వచ్చారు.

1770లో ఆంజర్స్ జీన్ లెక్నెల్ (1740-1784) అనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒక తోకచుక్కని కనుక్కున్నాడు. దాని చలనాలని జాగ్రత్తగా అనుసరించి దాని కక్ష్యని లెక్కించడం అంత కష్టం కాదని కనుక్కున్నాడు. హేలీ తోకచుక్క కన్నా చిన్నదైన దీర్ఘవృత్తాకారంలో అది తిరుగుతోంది. దాని కక్ష్య బట్టి చూస్తే అది ప్రతి 5.5 ఏళ్ళకి ఒకసారి సూర్యుడి సమీపంలోకి వస్తుంది.

మరైతే అంతకు ముందు ఎవరూ ఆ తోకచుక్కని ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? లెక్నెల్ కనుక్కున్న తోకచుక్క నడిచిన మార్గంలో అంతకు ముందు ఎవరూ మరే ఇతర తోకచుక్క నడవడం చూడలేదు.

ఆకాశంలో తోకచుక్క బాటని లెక్నెల్ పరిశీలించాడు. తనకి కనిపించక ముందు అది ఎటునుంచి వచ్చుండేదో లెక్కలు వేశాడు. అది బృహస్పతి గ్రహం దగ్గరనుండి వచ్చి ఉండాలని తేల్చాడు. బృహస్పతికి ఉన్న నాలుగు ఉపగ్రహాల మధ్య నుండి వచ్చేటంతగా ఆ గ్రహాన్ని సమీపించి ఉంటుందని తేల్చాడు.

బహుశా ఈ తోకచుక్కకి మొదట్లో పొడవైన దీర్ఘవృత్తాకారపు కక్ష్య ఉండి ఉంటుంది అనుకున్నాడు లెక్నెల్. బృహస్పతి గ్రహానికి సమీపంలోంచి వస్తుండగా ఆ గ్రహం ఆకర్షణ వల్ల కక్ష్య దిశ మారి ఉంటుంది. ఈ కొత్త కక్ష్య పాత కక్ష్య కన్నా బాగా చిన్నదై ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు.

కాని ఈ కొత్త కక్ష్య కూడా ఎంతో కాలం నిలవలేదు. లెక్కెల్ వర్ణించిన తోకచుక్క మళ్ళీ ఎప్పుడూ కనిపించనేలేదు. విషయం అర్థం కాక దాని గురించి మరిన్ని లెక్కలు వేశారు. 1770లో సూర్యుడిని సమీపించి తిరిగి వెళ్ళే దారిలో ఆ తోకచుక్క మళ్ళీ బృహస్పతికి సన్నిహితంగా పోయి ఉంటుందని లెక్కవేశాడు. కక్ష్య మళ్ళీ దిశ మారింది.

ఇలా వచ్చిన మార్పు వల్ల కక్ష్య ఎంతగా విస్తరించిందంటే అవతలి పక్క కక్ష్య మూసుకోనే లేదు. పారాబోలా కన్నా ఈ కక్ష్య విస్తరించి ఉంది. ఇలాంటి వక్రాన్ని హైపర్బోలా అంటారు.

లెక్కెల్ తోకచుక్కని బృహస్పతి ఏకంగా సౌరమండలంలోంచి బయటికి విసిరేసింది. ఇలాంటి 'విసుర్ల' వల్ల అప్పుడప్పుడు తోకచుక్కలు మనకి శాశ్వతంగా దూరం అయిపోయేవి.


లెక్కెల్ తోకచుక్కకి పట్టిన గతిని చూస్తే తోకచుక్క కక్ష్య నిర్ణయించే లెక్కల్లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అర్థమయ్యింది. గ్రహాల ప్రభావం వల్ల తోకచుక్కల గతిలో సమూలమైన మార్పులు రావచ్చు.

ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే లెక్కెల్ తోకచుక్క బృహస్పతికి, దాని ఉపగ్రహాలకి అంత సన్నిహితంగా వెళ్ళినా ఆ గ్రహం మీదగాని, దాని ఉపగ్రహాల మీద గాని తోకచుక్క ప్రభావం కొంచెం కూడా లేదు. అంటే తోకచుక్క ద్రవ్య రాశి అంత తక్కువగా ఉందన్నమాట.

అంతవరకు తోకచుక్కలు పెద్ద పెద్ద వస్తువులని, భూమిని ఢీ కొంటే భూమి నాశనమైపోతుందని భయపడేవారు.

కాని నిజానికి తోకచుక్కలు చాలా చిన్నవని ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలకి తెలుసు. వాటి వెనక వచ్చే 'కోమా' మాత్రం నెమలి తోకలా విశాలంగా ఉంటుంది. కొన్ని తోకచుక్కల తోకలు లక్షలాది కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటాయని అంచనా. అయితే కోమాలో గాని, తోకలో గాని ద్రవ్యరాశి తక్కువే. గురుత్వానికి ద్రవ్యరాశే ముఖ్యం.

తోకచుక్కని కొత్త కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టిన బృహస్పతి




సౌరమండలంలో కనుక్కున్న అతిచిన్న వస్తువుల్లో తోకచుక్కలు మొదటివి.

ఒక విధంగా 1700లలో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తోకచుక్కల విషయంలో కొంచెం నిరుత్సాహ పడ్డారనే చెప్పాలి. హేలీ తన పేరు పెట్టిన తోకచుక్క కక్ష్యని లెక్కించాక, అలా ఎన్నో తోకచుక్కల కక్ష్యలని లెక్కించడానికి వీలవుతుందని అందరూ ఉత్సాహపడ్డారు. కాని హేలీ తరువాత నూరేళ్ళు గడిచినా, మరే ఇతర తోకచుక్క కక్ష్యని నిర్ణయించలేకపోయారు. ఒక కక్ష్యని లెక్కెల్ నిర్ణయించానని అనుకున్నాడు. కాని తరువాత ఆ కక్ష్య మారిపోయిందని తేలింది.

ఇదిలా ఉండగా 1818లో జాన్ లూయీ పాన్స్ (1761- 1831) అనే ఒక ఫ్రెంచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒక కొత్త తోకచుక్కని కనుక్కున్నానని అనుకున్నాడు. జర్మన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త యొహాన్ ఫ్రాన్స్ ఎంకె (1791- 1865) దాని బాటని అధ్యయనం చేసి గతంలో 1786, 1795, 1805లో ఇతర తోకచుక్కలు అదే బాటలో నడిచాయని నిరూపించాడు.

ఈ సమాచారాన్ని బట్టి ఎంకె ఆ తోకచుక్క కక్ష్యని లెక్కించి దాని కక్ష్య చాలా చిన్నదని, 3.3 ఏళ్ళకి ఒకసారి సూర్యుడి చెంతకి వస్తుందని తేల్చాడు. సూర్యుడికి దూరంగా పోయినప్పుడు బృహస్పతి కక్ష్య దాకా కూడా పోవడం లేదని నిరూపించాడు.

ఆ తోకచుక్కకి ఎంకె తోకచుక్క అని పేరు పెట్టారు. హేలీ తోకచుక్క తరువాత పేరు పెట్టబడ్డ మొట్టమొదటి తోకచుక్క అనుకున్న సమయానికి రంచనుగా తిరిగొచ్చిన తోకచుక్క ఇదే.




ఎంకె తోకచుక్క 'తక్కువ ఆవర్తక కాలం' ఉన్న తోకచుక్క. ఎంకె కాలం తరువాత ఎన్నో తోకచుక్కల కక్ష్యలని లెక్కించడానికి వీలైనా, అంత చిన్న కక్ష్య ఉన్న తోకచుక్క సూర్యుడిని అంత తరచుగా సమీపించే తోకచుక్క మరొకటి కనిపించలేదు. మొత్తంమీద ఇప్పటివరకు ఎంకె తోకచుక్క సూర్యుడిని 50 సార్లు సమీపించడం గమనించారు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు.

ఎంకె తోకచుక్క కాంతి చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దూరదర్శినితోనే చూడగలం, అది కంటికి కనిపించదు. దూరదర్శినిలో కూడా కోమా కాస్త కనిపిస్తుందేగాని, తోక బొత్తిగా కనిపించదు. అసలు సూర్యుడి దగ్గరకి తరచుగా వచ్చే తోకచుక్కలన్నీ ఇలాంటి బక్కపలచ తోకచుక్కలే. అలా సూర్యుడిని సమీపించిన ప్రతిసారి తయారైన కోమాలోని ద్రవ్యరాశి తోకలోకి ప్రవేశించి శాశ్వతంగా నష్టమైపోతుంది. తోకచుక్క ఆ ద్రవ్యరాశిని శాశ్వతంగా పోగొట్టుకున్నట్టే. అంటే తిరిగొచ్చిన ప్రతిసారి తోకచుక్క కాంతి మరింత బలహీనం అవుతుందన్నమాట. చిన్న కక్ష్యలు కలిగి సూర్యుడిని తరచుగా సందర్శించే తోకచుక్కలు ఎప్పుడో తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. పొడవైన కక్ష్యలు కలిగి, సూర్యుడిని అరుదుగా మాత్రమే సమీపించే తోకచుక్కలు తమ ప్రకాశాన్ని ఎంతో కాలం నిలుపుకోగలిగాయి.

5. మృతి చెందిన తోకచుక్క

తోకచుక్క క్రమంగా పలచనై చివరికి ఏమవుతుంది? ఎంకె తోకచుక్కకి జరిగిన దాని బట్టి చూస్తే తోకచుక్క మధ్యలో కఠినమైన రాతికేంద్రం మాత్రం మిగులుతుందని అర్థమవుతుంది.

మరి ప్రతి సందర్భంలోను ఇలాగే జరుగుతుందా? ప్రతి తోకచుక్కలోనూ కఠినమైన రాతి కేంద్రం మిగిలిపోతుందా? ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం 1800లలో దొరికింది.



1826లో విల్హెల్మ్ వాన్ బియేలా (1782- 1856) అనే ఆస్ట్రీలియన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒక తోకచుక్కని కనుక్కున్నాడు. ప్రతి రాత్రి దాని స్థానంలో మార్పులని గమనిస్తూ వచ్చాడు. ఆకాశంలో దాని గమనాన్ని బట్టి దాని

కక్ష్య కాస్త చిన్న దీర్ఘవృత్తం అనిపించింది. అయితే ఎంకె తోకచుక్క కక్ష్య అంత చిన్నది కాదు దీని కక్ష్య.

ఈ తోకచుక్క 6.8 ఏళ్ళకి ఒకసారి సూర్యుడి వద్దకి వస్తుందని అంచనా వేశాడు. గతాన్ని తవ్వితే ఈ తోకచుక్క ఎన్నో సార్లు కనిపించిందని తెలిసింది. నిజానికి 1772లో కనిపించిన ఒక తోకచుక్క ప్రస్తుతం “బియేలా తోకచుక్క” అని పిలవబడుతున్న తోకచుక్కేనని అనిపించింది.

బియేలా తోకచుక్క మనకి తెలిసిన రెండవ లఘు కక్ష్య తోకచుక్క ఇది కూడా క్రమం తప్పకుండా సూర్యుడి వద్దకి మళ్ళీ మళ్ళీ రాసాగింది.

నిజానికి బియేలా ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఒక ఖగోళ శాస్త్రవేత్త విశ్లేషించి ఆ తోకచుక్క మళ్ళీ 27 నవంబరు, 1832 నాడు సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా వస్తుందని నిర్ణయించాడు. సరిగ్గా అనుకున్న రోజునే తోకచుక్క సూర్యుడికి అత్యంత సన్నిహితంగా వచ్చింది.

ఆ తరువాత బియేలా తోకచుక్క మళ్ళీ 1839లో కనిపించింది. ఆ సంవత్సరం భూమి స్థానం, బియేలా తోకచుక్క స్థానం ఎలా ఉన్నాయంటే తోకచుక్క ఎప్పుడూ సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నట్టే ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దాని ప్రకాశం బలహీనంగా ఉండడం వల్ల అంత స్పష్టంగా కనిపించలేదు.

కాని ఆ విషయాన్ని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అది తిరిగి పితృవరి 1846లో వస్తుందని వాళ్ళ నమ్మకం.

దాని కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకి బియేలా తోకచుక్క డిసెంబరు 1845లో దర్శనమిచ్చింది. సకాలంలోనే తిరిగొచ్చింది.

కాని దాని రూపురేఖలు మునుపట్లా లేవు. మాథ్యూ ఫోంటేన్ మారీ (1806- 1873) అనే అమెరికన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త మునుపటి బియేలా తోకచుక్కకి తోడుగా మరింత పలచనైన మరో తోకచుక్క ఉండడం గమనించాడు. రెండు తోకచుక్కలు జంటగా సూర్యుడిని సమీపిస్తున్నాయి. ఏం జరిగి ఉంటుంది?

1839లో తోకచుక్క సూర్యుడిని సమీపించినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకి సరిగ్గా కనిపించలేదు. బహుశ ఆ సమయంలో తోకచుక్కలోని పదార్థం బాగా వేడెక్కి అందులోంచి కొంత అంశం బయటికి వచ్చి “డంబెల్” ఆకారాన్ని దాల్చి ఉండొచ్చు. క్రమంగా ఆ డంబెల్ రెండుగా విరిగి ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న జంట తోకచుక్కలుగా మారిపోయి ఉండొచ్చు.

మరయితే 1852లో మళ్ళీ సూర్యుడిని సమీపించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో? ఈసారి పియోట్రో ఆంజెలో సెచ్చీ (1818- 1878) అనే ఇటాలియన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త దాన్ని గుర్తించాడు. ఈసారి కూడా రెండు తోకచుక్కలే ఉన్నాయి. కాని ఈసారి వాటి మధ్య దూరం పెరిగింది. చుట్టుపక్కల గ్రహాల ప్రభావం ఆ రెండు తోకచుక్కల మీద వేరుగా ఉండి ఉండొచ్చు. దానివల్ల రెండు తోకచుక్కల మధ్య దూరం పెరిగింది. అంతేకాదు ఆ రెండు తోకచుక్కల కక్ష్యలు కూడా ఇప్పుడు ఒక్కటి కావు. సెచ్చీ కొలతల బట్టి రెండు తోకచుక్కల మధ్య దూరం 24,14,000 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.


ఈసారి 1859లో మళ్ళీ తిరిగొచ్చింది. కాని సంధ్యాసమయంలో మాత్రం కనిపించేది. కాబట్టి దాన్ని స్పష్టంగా చూడడానికి వీల్లేకపోయింది. అందుకని 1866 వరకు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది.

ఈసారయినా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనుకున్నారు. కాని అనుకున్నట్లు జరగలేదు. 1866 వచ్చింది. వెళ్ళింది. కాని బియేలా తోకచుక్కల జంట అచూకీ ఎక్కడా లేదు. అంతేకాక అసలు మళ్ళీ ఎప్పుడూ కనిపించలేదు. బృహస్పతి దాన్ని అవతలికి విసిరేసిందా అంటే బృహస్పతి గ్రహం ఆ తోకచుక్క కక్ష్యలో లేదు. బహుశ 1859లో అది వచ్చినప్పుడు తోకచుక్కలోని పదార్థం అంతా కోమాలోకి, తోకలోకి ప్రవేశించి క్రమంగా చెల్లాచెదురై పోయిందేమో?

కాని మరి బియేలా తోకచుక్కలో అసలేమీ మిగలేదా? ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలంటే ఇక్కడ మనం ఉల్కల గురించి ప్రస్తావించుకోవాలి. ఈ ఉల్కలు రాలే తారల్లా చీకటి ఆకాశంలో మెరుపు రాతలు రాస్తూ కనిపిస్తాయి. అయితే అవి నిజంగా తారలు కావు. అంతరిక్షంలో

కొట్టుకుపోతున్న శిలలు పొరపాటున భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి మండి మసై నేలమీంచి చూసేవారికి మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి.

వస్తువులు వాతావరణంలో అధిక వేగం వద్ద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు గాలిలో రాపిడి వల్ల అతిగా వేడెక్కి ఆ వేడికి మండటం మొదలుపెడతాయి. ఆ మండే వస్తువులే ఆకాశంలో క్షణకాలం పాటు వెలిగి, మసై అంతరించిపోతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఉల్కల ద్రవ్యరాశి మరీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల, గాలిలోనే మొత్తం మండిపోక, కొంత భాగం ప్రచండ వేగంతో వచ్చి నేలని ఢీకొంటుంది. అలా నేలని చేరే శిలని, లేదా ఇనుప శకలాన్ని ‘ఉల్కాశిల’ (meteorite) అంటారు. ఈ ఉల్కాశిలలు అరుదుగానే కనిపిస్తాయి.



ఉల్కల్లో చాలా మటుకు పరిమాణంలో అతిచిన్నవి, ఉల్కాశిల కాదగినంత పెద్దవి కావు. గుండుసూది 'గుండు'ని మించదు వాటి పరిమాణం. కాని అంత చిన్న వస్తువులు కూడా వేగంగా గాల్లో దూసుకుపోతున్నప్పుడు కాంతులు వెదజల్లుతాయి.

ఇలాంటి సూక్ష్మమైన ఉల్కలు చాలా సామాన్యంగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో భూమి. అలాంటి ఉల్కల మేఘాలలోంచి దూసుకుపోతుంది. దాన్నే మనం 'ఉల్కాపాతం' అంటాం.

1833లో అమెరికా దేశంలో ఒక అద్భుతమైన ఉల్కాపాతం కనిపించింది. కోటానుకోట్ల కాంతిరేఖలతో, తారలు రాలిపడుతున్నట్లు ఆకాశమంతా వెలిగిపోయింది. అది చూసిన ప్రజలు ప్రపంచానికి ఇవే ఆఖరు క్షణాలు అనుకుని భయపడిపోయారు. కాని ఉల్కాపాతం ఆగిపోయాక చూస్తే ఆకాశంలో తారలు ఎప్పట్లాగే మినుకుమినుకుమంటూ కనిపించాయి.

చిన్న చిన్న వస్తువులైతే ఆకాశంలో పూర్తిగా మండిపోతాయి. ఉల్కాపాతం ఎంత దట్టంగా పడ్డా, నేలదాకా వచ్చేసరికి ఏమీ మిగలదు. 1833లో కనిపించిన ఉల్కాపాతం తరువాత ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అప్పుడప్పుడు భూమికి తారసపడే ఇలాంటి ఇసుక మేఘాల గురించి ఆలోచించసాగారు. ఈ మేఘాలు కూడా గ్రహాలలాగానే సూర్యుడి చుట్టూ నియత కక్ష్యలలో తిరుగుతూ ఉంటాయేమోనని అనుకోసాగారు.

జియోవానీ వర్సేనియో షియాపారెల్లి (1835- 1910) ఆ విషయాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. ఉల్కాపాతాలు ఎప్పుడు వస్తాయి, అవి కురిసినప్పుడు ఆకాశంలో ఏ దిశలోంచి కురుస్తాయి మొదలైన విషయాల గురించి వీలైనంత సమాచారం సేకరించాడు. 1860లలో అతడు కట్టిన లెక్కల బట్టి ఈ ఉల్కామేఘాలు కూడా దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలలో సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతాయని తేలింది. ఈ కక్ష్యలకి, తోకచుక్కల కక్ష్యలకి మధ్య చాలా దగ్గరి పోలిక కనిపించింది. ఆ పోలిక బట్టి తోకచుక్కలకి, ఉల్కాంశాలకి మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఉందా?

షియాపారెల్లి మాత్రం సంబంధం ఉందనే అనుకున్నాడు. ఒక ఉల్కాపాతం ప్రత్యేకంగా ఆగస్టు నెలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 'పెర్సియన్' అనే రాశిలో ఒక చోటి నుండి అది పుట్టుకొస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ ఉల్కలకి అందుకే 'పెర్సీడిస్' అనే పేరు వచ్చింది. టర్కిల్ తోకచుక్క కదిలే కక్ష్యలోనే ఈ పెర్సీడిస్ కదులుతున్నాయని నిరూపించాడు షియాపారెల్లి. (ఈ తోకచుక్కని 1853లో అమెరికన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త చార్లెస్ వెస్లీ టర్కిల్ కనుక్కున్నాడు. 14 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఇది సూర్యుడి సమీపంలోకి వస్తుంది.)

ఈ సమాచారం బట్టి చూస్తే తోకచుక్కలోని పదార్థం సూర్యుడి తాపానికి ఆవిరై వాయువుగా మారిపోయే తత్వం కలది అనిపించింది. ఆ వాయు పదార్థంలో రాతి శకలాలు చెల్లాచెదురై ఉన్నాయి. ఆ వాయు పదార్థం ఆవిరైపోయాక మిగిలిన రాతి పదార్థం సూర్యకాంతిలో మెరుస్తుంది. ఈ పదార్థమే తోకచుక్క యొక్క తోకగాను, కోమాగాను ఏర్పడుతుంది.

బహుశ వేడెక్కిన తోకచుక్కల నుండి విరిగిపడ్డ రాతి శకలాలే పృథ్వీ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి ఉల్కలుగా కనిపిస్తాయేమో. తోకచుక్క సూర్యుడి సమీపంలోకి వచ్చిన ప్రతిసారి దాని నుండి వేరుపడ్డ ఉల్కా శకలాలు వాటంతటవే సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెడతాయి. అవి మెల్లగా తోకచుక్క కక్ష్య అంతా విస్తరిస్తాయి. తరచు తోకచుక్కకి దూరంగా కన్నా తోకచుక్కకి దగ్గరగా ఎక్కువ శకలాలు కనిపిస్తాయి.

చివరికి తోకచుక్కలోని రాతి కేంద్రం మొత్తం ఆవిరైపోయాక, ఆ పదార్థం అంతా ధూళి మేఘాలుగా మారిపోతుంది. బహుశ బియేలా తోకచుక్క విషయంలో అదే జరిగి ఉంటుంది.

పెర్సీడిస్ ఉల్కాపాతం టర్కిల్ తోకచుక్క నుండి జనించింది అని షియాపారెల్లి నిరూపించాక, ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఆ సూత్రాన్ని బియేలా తోకచుక్కకి వర్తింపజేసి చూశారు. బియేలా తోకచుక్క కక్ష్య ఏంటో తెలుసును కాబట్టి ఆ దారి పొడవునా ధూళి కణాలు ఉన్నాయేమోనని చూశారు.

ముఖ్యంగా తోకచుక్క కేంద్రం ఉన్న చోట సాంద్రమైన ధూళి రాశి ఉండి ఉండాలి.

ఆ ప్రదేశానికి సమీపంగా భూమి వచ్చేదాకా ఎదురుచూశారు. ఇ. వైస్ అన్ అనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త 1872 నవంబరు 28 నాడు ఉల్కాపాతం వస్తుందని లెక్కకట్టి చెప్పాడు. అతడి లెక్కలో ఒక్క రోజు తేడా వచ్చింది. అది 27 నవంబరు నాడు కనిపించింది.


ఈ ప్రత్యేకమైన ఉల్కాపాతానికి బీలిడ్స్ అని పేరు పెట్టారు. అది మరి కొన్నిసార్లు కనిపించి బలహీనం అయిపోయింది. ఆ ధూళి మేఘం కక్ష్య అంతా విస్తరించి ఉంది. కాని మంచి వెలుగు వానికి కావలసినంత సాంద్రత ఆ మేఘానికి లేదు.

6. ఇంతకీ తోకచుక్కలలో ఏముంటుంది?

1950లో యాన్ హెన్రిక్ ఊర్ట్ (1900- 1992) అనే డచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త సూర్యుడికి ఎంతో దూరంలో ఒక వస్తు సమూహంతో కూడుకున్న మేఖల (belt) ఒకటి ఉందని సూచించాడు. అవి కోటానుకోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి ఉండొచ్చు. కాబట్టి వాటిని ఎంత పెద్ద దూరదర్శినితోనైనా చూసే అవకాశం ఉండదు. అలాంటి రాళ్ళు అక్కడ నూరు కోట్ల దాకా ఉండి ఉండొచ్చని అంచనా. ఆ చిన్న వస్తువులే సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు తోకచుక్కలు అవుతాయి.


అమెరికన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఫ్రెడ్ లారెన్స్ విపిల్ (1906- 2004) మరో విషయం కూడా సూచించాడు. అంతరిక్షంలో అంత దూరంలో ఎంత చల్లగా ఉంటుందంటే దూరంగా ఉన్న తోకచుక్కల్లోని పదార్థం భూమి మీద వాయుపదార్థంగా ఉంటుంది. అమోనియా, మీథేన్, సయనోజెన్ (కార్బన్, నైట్రోజన్ కలయిక), మొదలైన వాయువులన్నీ తోకచుక్కలో మంచుగడ్డల్లా ఉంటాయి. ఇవి కాక నీరు గడ్డ కట్టుకున్న మంచు కూడా తోకచుక్కల మీద ఉంటుంది.

ఈ మంచు పదార్థంలో చిన్న చిన్న రాళ్ళు చెల్లా చెదురుగా విస్తరించి




ఉంటాయి. మధ్యలో రాతి కేంద్రం కొన్నిసార్లు ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు లేకపోవచ్చు కూడా.


అయితే కొన్ని సందర్భాలలో దూరంగా ఉన్న తోకచుక్క తోక మీద సౌరపవనాల ప్రభావం వల్ల దాని సువిస్తారమైన వృత్తాకార కక్ష్యంలో ఆ తోకచుక్క నడిచే వేగం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలా వివిధ వేగాల



18 డిసెంబరు 1973




31 డిసెంబరు 1973




29 డిసెంబరు 1973



2 జనవరి 1974



30 డిసెంబరు 1973



5 జనవరి 1974

స్మెలాబ్ నుంచి తీసిన కొహోటెక్ తోకచుక్క ఆరు చిత్రాలు

మధ్య కదిలే తోకచుక్కలు ఒకదాంతో ఒకటి ఢీ కొనడం వల్లగాని, దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాల గురుత్వాకర్షణ వల్లగాని తోకచుక్కల వేగం తగ్గవచ్చు.

వేగం తగ్గిన తోకచుక్క సూర్యుడి దిక్కుగా పతనం చెందడం మొదలుపెడుతుంది. అలా సూర్యుడి వైపుగా పడుతున్న తోకచుక్క కక్ష్య దీర్ఘవృత్తానికి మారుతుంది. గ్రహాలని వరసగా దాటుకుంటూ సూర్యుడిని

సమీపించినప్పుడు మెరిసి మనని మురిపిస్తుంది. సూర్యుడి చుట్టూ ఒక ప్రదక్షిణ చేసి తిరిగి తన సుదూరమైన స్వగ్రహానికి తరలిపోతుంది. అలాంటి దీర్ఘ కక్ష్యలో కొన్నిసార్లు పది లక్షల సంవత్సరాలకొకసారి మాత్రమే సూర్యుడి దగ్గరికి వస్తూ ఉండొచ్చు.

తోకచుక్క ఈవిధంగా సూర్యుడిని సమీపించినప్పుడు అందులోని మంచు పదార్థం ఆవిరైపోతుంది. అందులోని రాతి పదార్థం విడుదల పొంది కోమాగా మారుతుంది.

1958లో యూజీన్ నార్మన్ పార్కర్ (1927-) అనే అమెరికన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అణువుల కన్నా చిన్నవైన రేణువులు సూర్యుడిలో పుట్టుకొచ్చి నలుదిశలా ప్రసరిస్తాయని నిరూపించాడు. ఆ రేణువులనే సౌరపవనం అంటారు. ఈ సౌరపవనమే తోకచుక్క కోమా మీద పడి సూర్యుడికి దూరంగా దాన్ని వికర్షిస్తూ అదొక తోకలా ఏర్పడేట్టు చేస్తుంది.

మొట్టమొదటిసారిగా సూర్యుడి సమీపానికి వచ్చిన తోకచుక్కల కోమా పరిమాణం చాలా పెద్దగా ఉండొచ్చు. దాని పరిమాణం సూర్యుడి పరిమాణం కన్నా కూడా పెద్దదిగా ఉండొచ్చేమో. కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు దాని తోక విస్తరించి ఉంటుంది.

అప్పుడప్పుడు పెద్ద గ్రహాల ప్రభావం వల్ల, ముఖ్యంగా బృహస్పతి ప్రభావం వల్ల, తోకచుక్క గతి కొద్దిగా మళ్ళుతుంది. అలాంటప్పుడు తోకచుక్క చిన్న కక్ష్యలోకి మారిపోతుంది. పదే పదే సూర్యుడిని సమీపిస్తూ తోకచుక్క క్రమంగా క్షీణిస్తుంది. హేలీ తోకచుక్క కూడా క్షీణించడం కనిపిస్తుంది.

అంతరిక్షపు ప్రగాఢ లోతుల్లోంచి వచ్చిన ఓ ప్రకాశవంతమైన తోకచుక్క 1882లో మొట్టమొదటిసారిగా కనిపించింది. గత శతాబ్దంలో రూపొందించిన అధునాతన సాంకేతిక పరికరాల సహాయంతో అంత దూరం నుండి వచ్చే తోకచుక్కలని అధ్యయనం చెయ్యాలని 1882 నుండి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు. చివరికి 1973లో జెకోస్లావేకియాకి చెందిన లూబ్జ్

కొహోటెక్ (1935-) అనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒక తోకచుక్కని భూమికి ఎంతో దూరంలో ఉండగానే పసిగట్టాడు. అంటే ఆ తోకచుక్క చాలా పెద్దదై ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే అంత దూరం నుండి కనిపించేలా కాంతిని ప్రతిబింబించదు.

కక్ష్యని బట్టి చూస్తే ఈ 'కొహోటెక్ తోకచుక్క' సుదూరమైన చిన్న వస్తువుల మేఖల నుండి బయలుదేరి వస్తోందని తేలింది. అది 28 డిసెంబరు 1973లో సూర్యుడికి అత్యంత సన్నిహితంగా వచ్చింది. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఆశించినంత ప్రకాశవంతంగా కనిపించలేదు. అయినా అంతరిక్షంలో తిరిగే స్కయిలాబ్ సహాయంతో దాన్ని అధ్యయనం చేశారు. సూర్యుడికి దూరం అవుతున్నప్పుడు కూడా దాన్ని అధ్యయనం చేశారు.

భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సుదూరమైన అంతరిక్ష మూలం నుండి వస్తున్న తోకచుక్క కనిపించగానే మనుషులు రాకెట్‌మీద బయలుదేరి దాని మీద వాలగలిగే రోజు వస్తుంది.

అప్పుడిక తోకచుక్క అంటే దుశ్శకునం అని భయపడకుండా మనుషులు ప్రత్యక్షంగా దాన్ని అందుకుంటారు. దాన్ని తాకి దాని నుండి శకలాలని భూమికి తెచ్చి వాటిని అధ్యయనం చేసి వాటి నిజస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటారు.